



INH

يُحَولُّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الإِصَابَةِ بِالسُّلِّ.

Arabic Version

الموعد التالي لتناول الدواء:

الوقت:	التاريخ:

إذا كانت لديك أسئلة، اتصل بـ:

:INH نصائح حول تناول دواء

1. تناول جرعتك اليومية من دواء INH في الوقت نفسه من اليوم.
 واستخدم رزنامة لتساعدك على ضبط تناول الدواء يومياً. فمن المهم
 جداً لا يمر يوم دون أن تأخذ فيه دواءك.

2. لا تتناول المشروبات الكحولية أثناء التداوي بهذا الدواء.

3. احفظ الدواء INH في مكان آمن بعيد عن متناول الأطفال.

4. لا تنس مواعيد تناول الدواء.

5. إذا ظهرت لديك أعراض جانبية، اتصل بالمرضية المسؤولة عن
 علاجك في مديرية صحة المنطقة أو بطبيبك.

6. تعليمات خاصة:



كيف أتخلص من جراثيم السل التي في جسمي؟

يمكنك تناول دواء الإيزونيازيد، الذي يدعى أيضاً INH، وهو دواء ضد السل يستطيع قتل جراثيم هذا المرض. فإذا تناولت هذا الدواء حسب إرشادات طبيبك، فإنه يقلل إلى حد كبير من فرص التطور الإيجابي للسل لديك.

كم من الوقت يتطلب على أن أتناول دواء INH؟

يؤخذ الدواء عادة مرة في اليوم أو حسب إرشادات الطبيب. وتتراوح مدة العلاج به من ستة إلى تسعة أشهر.

ولا يكون لهذا الدواء مفعول إلا إذا أخذ بانتظام — كل يوم أو حسب إرشادات الطبيب.

قد تخضع للمراقبة المباشرة أثناء العلاج (DOT) طيلة مدة علاجك. ويعني مصطلح DOT أن عاملأً صحيأً سيأتي لمقابلتك كلما حان موعد تناولك الدواء INH ويراقبك أثناء تناولك الدواء.

هل دواء INH آمن؟

أظهرت الدراسات أن دواء INH آمن وفعال جداً للناس من جميع الأعمار. ولا يواجه معظم الناس مشكلات في تناولهم إياه. وكما هي الحال مع سائر الأدوية، يمكن أن تظهر لهذا الدواء آثار جانبية. لكن آثاره الجانبية لا تدوم وتخفي فور التوقف عن تناوله.

إذا واجهت أيّاً من المشكلات المذكورة أدناه، توقف عن تناول الدواء INH فوراً واتصل بطبيبك أو بالمرضة المسؤولة عن علاجك في مديرية صحة المنطقة.

الآثار الجانبية لدواء INH:

- فقدان الشهية والشعور بالتعب دونها سبب.
- تحول لون البول إلى داكن (كلون الشاي أو القهوة).
- اصفرار العينين أو تحول لونهما إلى "داكن".
- اصفرار الجلد، أو الحكة الدائمة فيه.
- شعور دائم بالوخز ("كوكخ الإبر") أو الخدر في اليدين أو القدمين.
- ارتفاع في درجة الحرارة دون سبب ظاهر.

ساهم في حماية
نفسك من السل!

أنا لست مريضاً!

لماذا يتطلب مني تناول الدواء؟

تظهر نتائج الفحص الذي أجريته وجود جراثيم السل (TB) في جسمك أو أنك تعرضت مؤخراً لتماس مع شخص مصاب بمرض السل الإيجابي المُعدي. ولما يظهر المرض عليك بعد في صورته الفعالة، فجراثيم السل لديك الآن "نائمة"، لكنها حية. وقد وصلت إلى عدة أعضاء من جسمك كالرئتين والعمود الفقري والكليتين. ولديك ما يُدعى "عدوى السل الكامنة". وعندما تكون لديك عدوى سل كامنة، لا يمكن أن تنتقل منه إلى سواك.

ولكن، إذا أصابك مرض آخر أو "إرهاق"، قد تستيقظ جراثيم السل النائمة لديك وتبدأ بالتكاثر حتى تصيبك بالسل بالفعل. وإذا أصبحت فعلاً بالسل، يمكنك أن تنقل المرض إلى الآخرين، وبالخصوص الغربيين منه.